

SYNDROME ALPHA-GAL

Allergie IgE-médiée à l'alpha-gal

Réactions alimentaires parfois retardées de plusieurs heures

Délai habituel : environ 2 à 6 h après exposition.

Nom

Prénom

Date de naissance

ÉVICATIONS PRINCIPALES

Viandes et abats de mammifères : bœuf · porc · mouton/agneau · gibier · lapin · abats.

Autres évictions personnalisées : ☐ gélatine ☐ laitages ☐ graisses animales ☐ autre : _____

URGENCE

Adrénaline prescrite : ☐ oui ☐ non

En cas d'anaphylaxie : utiliser l'adrénaline selon le plan d'urgence et appeler le 15 / 112.

IMPORTANT POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Patient présentant un syndrome alpha-gal

Vérifier les produits d'origine mammalienne avant administration lorsqu'ils sont pertinents.

À SIGNALER / VÉRIFIER PARTICULIÈREMENT

Cetuximab - risque alpha-gal bien documenté.

- gélatine bovine/porcine et produits à base de gélatine ;
- enzymes pancréatiques porcines ;
- héparine, surtout si forte dose IV ;
- certaines bioprothèses bovines/porcines ;
- certains antivenins ;
- certains vaccins/médicaments contenant de la gélatine.

**Ne pas contre-indiquer
automatiquement tous les
médicaments, vaccins ou excipients
d'origine potentiellement animale.**

Vérifier la formulation avec
l'allergologue / pharmacien.

Allergologue / médecin : _____

Téléphone : _____

Plan d'urgence disponible : ☐ oui